



Département de la Gironde

Zone de surveillance du Libournais

Communes : Arveyres, Fronsac, Libourne, Saint-Sulpice-de-Faleyrens.

Bilan des interventions




Volume horaire

Période du 01/10/2018 au 31/10/2018	166h 30mn
Evolution par rapport à la période du 01/10/2017 au 31/10/2017	+113h 30mn


Volume biocide

Période du 01/10/2018 au 31/10/2018	2.5kg
Evolution par rapport à la période du 01/10/2017 au 31/10/2017	+2.5kg

Les 2 principales espèces traitées




Profil de *Culiseta annulata*




Profil de *Culex pipiens (s.l.)*

Evolution présence d'adultes



Observations


La pluviométrie mensuelle encore déficitaire (62mm) associée aux marées de vives eaux (coefficients 108) n'ont eu qu'une faible incidence sur les secteurs contrôlés qui se sont asséchés rapidement. Les prospections réalisées sur l'ensemble des communes, n'ont mis en évidence aucune présence larvaire significative. En conséquence, aucun traitement n'a été mis en œuvre. Les captures n'ont révélé aucune présence de moustiques adultes.



Légende :		 Echelle : 1 / 25 000
 Secteurs surveillés	Activités :  Prospection  Prospection et traitement  Point de capture	
<small>Réalisation : DST - Service Développement et Système d'Information. C.L. Source : © IGN Paris - Géoportail © Données EID Atlantique</small>		



Légende :		 Echelle : 1 / 25 000
 Secteurs surveillés	Activités :  Prospection  Prospection et traitement  Point de capture	
<small>Réalisation : DST - Service Développement et Système d'Information. C.L. Source : © IGN Paris - Géoportail © Données EID Atlantique</small>		



Légende :		 Echelle : 1 / 25 000
 Secteurs surveillés	Activités :  Prospection  Prospection et traitement  Point de capture	
<small>Réalisation : DST - Service Développement et Système d'Information. C.L. Source : © IGN Paris - Géoportail © Données EID Atlantique</small>		